

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

AGROPAK sp. j. B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d,
43-603 Jaworzno, tel./fax: (0 prefiks 32) 61 56 330, 61 56 944, e-mail: agropak@agropak.com.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Systemik 125 SL

Środek grzybobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem i mączniakiem oraz przeciwko chorobom grzybowym roślin ozdobnych pod osłonami

Zawartość substancji aktywnej:

mychlobutanil [(RS)-2-(4-chlorofenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometrylo)-heksanonitryl;
związek z grupy triazoli]– 125 g w 1 litrze środka.

**Zezwolenie MRiRW Nr R-8/2004 z dnia 04.03.2004 r. zmienione decyzją MRiRW
Nr R-95/2007 z dnia 28.03.2007 r.**



Szkodliwy

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem**

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny sadownicze

- **jabłoń**

- parch jabłoni.

- Zalecana dawka: 0,45-0,6 l/ha

- Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Środek w dawce 0.45 l/ha stosować zapobiegawczo po kwitnieniu co 10-14 dni.

Środek w dawce 0,6 l/ha stosować interwencyjnie (do 72 godzin po infekcji) i w okresie większego nasilenia choroby.

- mączniak jabłoni.

- Zalecana dawka: 0,45-0,6 l/ha

- Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

Środek w dawce 0,6 l/ha w okresie większego nasilenia choroby.

Zabiegi wykonywać od fazy różowego pąka co 10 dni.

Rośliny ozdobne (pod osłonami)

- **róża**

- mączniak prawdziwy.

- **difenbachia**

- plamistość pierścieniowa

- Zalecane stężenie: 0,03% (30 ml środka w 100 litrach wody)

- Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 litr na 10 m².

Środek stosować po zauważeniu pierwszych, sporadycznych objawów choroby. W celu zahamowania rozwoju chorób należy wykonać co najmniej 2 zabiegi.

UWAGI:

1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12^oC
2. Do ochrony jabłoni środek stosować przemiennie z fungicydami z innych grup chemicznych.
3. Przed zastosowaniem środka do opryskiwania roślin ozdobnych, na każdej pierwszy raz opryskiwanej odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):

jabłka: 7 dni

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 35°C.

Chronić przed dziećmi

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać par cieczy użytkowej.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-prefiks-58) 301 65 16

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99

Lublin – (0-prefiks-81) 740 26 76

Łódź – (0-prefiks-42) 657 99 00

Poznań – (0-prefiks-61) 847 69 46

Rzeszów – (0-prefiks-17) 866 44 09

Sosnowiec – (0-prefiks-32) 266 11 45

Warszawa – (0-prefiks-22) 619 08 97

Wrocław – (0-prefiks-71) 343 30 08.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -