

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

AGROPAK sp. j. B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno,
tel./fax: (0 prefiks 32) 61 56 330, 61 56 944, e-mail: agropak@agropak.com.pl

**Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

Agrostym 480 SL

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, przeznaczony do przyspieszania zbioru i poprawy wybarwienia jabłek oraz przyspieszania dojrzewania pomidora uprawianego w gruncie.


Zawartość substancji aktywnej: **etefon** (kwas 2-chloroetylofosfonowy; związek z grupy generatorów etylenu) - 480 g/l

Zezwolenie MRiRW. Nr 865/2001 z dnia 23.07.2001 r.

Zmienione decyzją MRiRW Nr R-272/2003p z dnia 05.08.2003 r.

decyzją MRiRW Nr R-693/2003 z dnia 03.11.2003 r.,

decyzją MRiRW Nr R- 338/2007 z dnia 13.07.2007 oraz decyzją MRiRW nr R-11/2008 z dnia 17.01.2008 r.



Drażniący

Działa drażniąco na skórę.

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

- jabłoń

- przyspieszanie zbioru i poprawa wybarwienia jabłek

-Zalecane stężenie:

Agrostym 480 SL 0,12% (120 ml środka w 100 l wody) + Pomonit Super 050 SL 0,04% (40 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość wody : 500-700 l/ha.

Opryskiwać na 7-10 dni przed zbiorem jabłek.

- pomidor

-przyspieszanie dojrzewania pomidora gruntowego

Zalecana dawka: 2-3 l/ha

Zalecana ilość wody: 600-1000 l /ha

Wyższą z zalecanych dawek stosować w okresie chłodniejszym (w temperaturze powietrza poniżej 16°C) oraz w roślinach o dużej masie liści.

Opryskiwać dokładnie całe rośliny terminie, gdy owoce dojrzałe i dojrzewające, tj. czerwone, różowe i „zapalone” stanowią 5-15%, a owoce zielone (wyrośnięte) 50-70% ogółu owoców na roślinach.

Uwaga:

Środek stosować do 5 godzin przed spodziewanym deszczem.

**OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY.**

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): jabłoń, pomidor - 7 dni

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie mniejszej niż -8°C i nie większej niż 30°C

Chronić przed dziećmi

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Resztki niez użyttej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349-28-31

Rzeszów – (0-17) 866-40-25

Kraków - (0-12) 411-99-99

Sosnowiec – (0-32) 266-11-45

Lublin – (0-81) 740-89-83

Tarnów – (0-14) 631-51-77

Łódź – (0-42) 657-99-00

Warszawa – (0-22) 619-66-54

Poznań – (0-61) 847-69-46

Wrocław – (0-71) 343-30-08

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -